

პროექტიხარისხის შეფასების ინდიკატორების ნუსხა

ჯგუფი	დეფინიცია	წყარო	
		OECD	GEO
1. ამბულატორიული მომსახურების დროს თავიდან აცილებადი ჰოსპიტალიზაცია (სენსიტიური მდგომარეობები)	ასთმის დიაგნოზით ჰოსპიტალიზაციის შემთხვევების რაოდენობა მოზრდილ პოპულაციაში (ასაკისა და სქესის მიხედვით სტანდარტიზებული მაჩვენებელი 100000 მოსახლეზე)	✓	'15
	ფილტვების ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადებით ჰოსპიტალიზაციის შემთხვევების რაოდენობა მოზრდილ პოპულაციაში (ასაკისა და სქესის მიხედვით სტანდარტიზებული მაჩვენებელი 100000 მოსახლეზე)	✓	'15
	დიაბეტით ჰოსპიტალიზაციის შემთხვევების რაოდენობა მოზრდილ პოპულაციაში (ასაკისა და სქესის მიხედვით სტანდარტიზებული მაჩვენებელი 100000 მოსახლეზე)	✓	'15
2. პაციენტის უსაფრთხოება	ჰოსტოპერაციული პულმონური ემბოლიზმი ან ღრმა ვენების თრომბოზი მოზრდილ პოპულაციაში (ადაპტირებული (Adjusted) მაჩვენებელი 100000 გაწერილ პაციენტზე)	✓	
	ჰოსტოპერაციული სეფსისი მოზრდილ პოპულაციაში (ადაპტირებული (Adjusted) მაჩვენებელი 100000 გაწერილ პაციენტზე)	✓	
	სამშობიარო ტრავმა ფიზიოლოგიური მშობიარობისას ინსტრუმენტების გამოყენებით (მაჩვენებელი(Crude) 100 ფიზიოლოგიურ მშობიარობაზე ინსტრუმენტების გამოყენებით)	✓	✓
	სამშობიარო ტრავმა ფიზიოლოგიური მშობიარობისას ინსტრუმენტების გამოყენების გარეშე (მაჩვენებელი(Crude) 100 ფიზიოლოგიურ მშობიარობაზე ინსტრუმენტების გამოყენების გარეშე)	✓	✓
	გადაუდებელი რეჰოსპიტალიზაცია მშობიარობიდან 30 დღის განმავლობაში	(1)	
2.1 ჰოსპიტალში შეძენილი ინფექციები	სამედიცინო მომსახურებასთან დაკავშირებული ინფექციების მაჩვენებელი 100 გაწერილ პაციენტზე	✓	
	ფილტვების ხელოვნურ ვენტილაციასთან ასოცირებული პნევმონიის მაჩვენებელი	✓	
	ქირურგიული ჭრილობის ინფექციების მაჩვენებელი	✓	
2.2 სენტინელური მოვლენები	ტრანსფუზიის მაჩვენებელი ქირურგიული ოპერაციების დროს ან ტრანსფუზიის გართულებების მაჩვენებელი	✓	
	ანესთეზიის გართულებები	✓	
3. ხელმისაწვდომობა და სამართლიანობა	ბაზისური სერვისებით მოსახლეობის მოცვის მაჩვენებელი (მთლიანი პოპულაციის %)	✓	✓*
	ჯანდაცვაზე ჯიბიდან გადახდების წილი შინამეურნეოების საბოლოო მოხმარებიდან)	✓	
	სამედიცინო გამოკვლევებზე დაუკმაყოფილებელი საჭიროებები შემოსავლების ჯგუფების მიხედვით	✓	
	სამკურნალობაში საშუალებებზე ჯიბიდან გადახდების წილი (მთლიანი ჯიბიდან გადახდების %)	✓	
	საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგი ბოლო სამი წლის განმავლობაში განათლების დონის მიხედვით (% 25-60 წლის ასაკის ქალების რაოდენობიდან)	✓	

	ძუძუს კიბოს სკრინინგი ბოლო ორი წლის განმავლობაში განათლების დონის მიხედვით (% 40-70 წლის ასაკის ქალების რაოდენობიდან)	✓	
	მსხვილი ნაწლავის კიბოს სკრინინგი სულ მცირე ერთხელ სიცოცხლის განმავლობაში განათლების დონის მიხედვით (% 50-70 წლის ასაკის მოსახლეობის რაოდენობიდან)	✓	
4. სამკურნალო საშუალებების დანიშვნა და მოხმარება	პირველადი ჯანდაცვაში დანიშნული ანტიბიოტიკების მთლიანი მოცულობა (დღიური განსაზღვრული დოზა 1000 მოსახლეზე)	✓	2017
5. პაციენტის კმაყოფილება	ექიმის მიერ პაციენტისთვის გასაგები ფორმით ინფორმაციის მიწოდება (ასაკის მიხედვით სტანდარტიზებული მაჩვენებელი 100 პაციენტზე)	✓	
	პაციენტების რაოდენობა, რომელთაც ექიმმა მისცა კითხვების დასმის ან პრობლემებზე საუბრის შესაძლებლობა (ასაკის მიხედვით სტანდარტიზებული მაჩვენებელი 100 პაციენტზე)	✓	
6. იმუნიზაცია	დიფტერია, ტეტანუსი, ყოვანაზველას იმუნიზაციის მაჩვენებელი ბავშვებში (აღრილი ბავშვების %)	✓	✓
	წითელას იმუნიზაციის მაჩვენებელი ბავშვებში (1 წლის ასაკის აწრილი ბავშვების %)	✓	✓
	ჰეპატიტი B იმუნიზაციის მაჩვენებელი ბავშვებში (1 წლის ასაკის აწრილი ბავშვების %)	✓	✓
7. დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა	საკეისრო კვეთების მაჩვენებელი	✓	✓
	პირველი საკეისრო კვეთების მაჩვენებელი	(2)	✓
	ორსულთა რაოდენობა, რომელთაც ჰქონდათ ანტენატალური ვიზიტი ორსულობის პირველ ტრიმესტრში	(4)	✓
	ექსკლუზიური ძუძუთი კვების მაჩვენებელი სამშობიაროდან გაწერისას	(2)	
	34 კვირამდე გესტაციური ასაკის მშობიარობათა რაოდენობა, რომელიც არ განხორციელდა მესამე დონის ჰოსპიტალში	(2)	
8. ტუბერკულოზი	ფილტვის ტუბერკულოზით დაავადებული პაციენტების წილი, რომელთაც დაასრულეს მკურნალობა 12 თვემდე		
	მგბ+ მქონე ტუბერკულოზით დაავადებული პაციენტების წილი 12 თვემდე		
9. დიაბეტი	თვალის გამოკვლევები დიაბეტის მქონე პაციენტებში		
	ქვედა კიდურების ამპუტაციის მაჩვენებელი დიაბეტის მქონე პაციენტებში		
10. არტერიული ჰიპერტენზია და გულსისხლძარღვთა დაავადებები	მოკარდიუმის მწვავე ინფარქტის გამო ჰოსპიტალიზებული 45 წლის და ზემოთ ასაკის პაციენტების სიკვდილის შემთხვევების მაჩვენებელი, როდესაც სიკვდილი დადგა ჰოსპიტალიზაციიდან 30 დღის განმავლობაში (ჰოსპიტალიზაციის მაჩვენებელი და პაციენტების მაჩვენებელი, (ასაკისა და სქესის მიხედვით სტანდარტიზებული მაჩვენებელი 100 ჰოსპიტალიზაციაზე ან 100 პაციენტზე) მოსახლეზე)	✓	'15
	იმემიური ინსულტით ჰოსპიტალიზებული 45 წლის და ზემოთ ასაკის პაციენტების სიკვდილის შემთხვევების მაჩვენებელი, როდესაც სიკვდილი დადგა ჰოსპიტალიზაციიდან 30 დღის განმავლობაში (ჰოსპიტალიზაციის მაჩვენებელი და პაციენტების მაჩვენებელი, (ასაკისა და სქესის მიხედვით სტანდარტიზებული მაჩვენებელი 100 ჰოსპიტალიზაციაზე ან 100 პაციენტზე) მოსახლეზე)	✓	
11. ავთვისებიანი სიმსივნეები	საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგის მაჩვენებელი 25-60 წლის ასაკის ქალებში (% ქალების რაოდენობიდან, რომელთაც ჩაუტარდათ სკრინინგი)	✓	✓
	საშვილოსნოს ყელის კიბოს შემთხვევები ხუთი წლის გადარჩენის	✓	'15

	მაჩვენებელი (ასაკისმიხედვით სტანდარტიზებული გადარჩენის მაჩვენებელი, %)		
	საშვილოსნოს ყელის კიბოს გამო სიკვდილიანობის მაჩვენებელი (ასაკის მიხედვით სტანდარტიზებული მაჩვენებელი 100 000 ქალზე)	✓	✓
	ძუძუს კიბოს სკრინინგი (მამოგრაფია) 40-70 წლის ასაკის ქალებში (% ქალების რაოდენობიდან, რომელთაც ჩაუტარდათ სკრინინგი)	✓	✓
	ძუძუს კიბოს შემთხვევები ხუთი წლის გადარჩენის მაჩვენებელი (ასაკისმიხედვით სტანდარტიზებული გადარჩენის მაჩვენებელი, %)	✓	'15
	ძუძუს კიბოს დიაგნოზით სიკვდილიანობა ქალებში (ასაკის მიხედვით სტანდარტიზებული მაჩვენებელი 100 000 ქალზე)	✓	✓
	კოლორექტული სიმსივნის დიაგნოზით სიკვდილიანობა (სქესისა და ასაკის მიხედვით გადარჩენის სტანდარტიზებული მაჩვენებელი, %)	✓	'15
	ძუძუს კიბოს დიაგნოზით სიკვდილიანობა (ასაკის მიხედვით სტანდარტიზებული მაჩვენებელი 100 000 მოსახლეზე)	✓	✓
12. ფსიქიკური ჯანმრთელობა	ფსიქიკური აშლილობების მქონე პაციენტების სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 100000 მოსახლეზე	✓ ადაპტ.	
	ჰოსპიტალიზაციის შემდგომი დროული ამბულატორიული მიმართვიანობის მაჩვენებელი	✓ ადაპტ.	2017
	ფსიქიკური აშლილობების მქონე პირთა რეჰაბილიტაცია (არანაკლებ 7, 30 დღე)	✓	
	6 თვეზე მეტი ხნით ჰოსპიტალიზებული ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირების რაოდენობა		ახალი
13. რესურსების მოხმარება და ხარჯები	საავადმყოფოში დაყოვნების საშუალო მაჩვენებელი	✓	
	საავადმყოფოში დაყოვნების საშუალო მაჩვენებელი ფიზიოლოგიური მშობიარობისას	✓	
	საავადმყოფოში დაყოვნების საშუალო მაჩვენებელი მიოკარდიუმის მწვავე ინფარქტების დროს	✓	
	ჯანდაცვაზე დანახარჯები ერთ სულზე (სახელმწიფო, კერძო, %)	✓	
	ჯანდაცვაზე დანახარჯები ფუნქციების მიხედვით (ჰოსპიტალური, ამბულატორიული, ხანგრძლივი მოვლა, საზოგადოებრივი ჯანდაცვა, სამკურნალო სამედიცინო საშუალებები)	✓	
	ჯანდაცვაზე დანახარჯები დაფინანსების წყაროების მიხედვით (სახელმწიფო, კერძო, ჯიბიდან გადახდა და სხვა)	✓	