

შპს ავერსის კლინიკა
საქართველო, თბილისი, 0160
ვაჟა-ფშაველას 27ბ
ტელ.: (+995 32) 2 500 700

ავერსის კლინიკა
AVERSI CLINIC
info.clinic@aversi.ge

20051083
AVERSI CLINIC Ltd
27b, Vazha-Pshavela ave.
0160, Tbilisi Georgia
Tel.: (+995 32) 2 500 700

კომპიუტერული ტომოგრაფია

რეგისტრაციის № 39270/18

1.05.2018

თარიღი:

ირაკლი გახოკიძე

ექიმის გვარი და სახელი

ქაჩიბაია

პაციენტის გვარი:

აკაკი

სახელი:

23

ასაკი

პაციენტის სქესი: ☐ მამრობითი / ☒ მდედრობითი;

გამოკვლეული სეგმენტი: GDDD1A-გულმკერდის ღრუ

კონტრასტი: - - - ; საკონტრასტო ნივთიერება: - - -

ჩატარდა გულმკერდის ღრუს კ.ტ. კვლევა.

მიღებულ ტომოგრამებზე გულმკერდი დეფორმაციის გარეშე, მისი რბილი ქსოვილები ხილული პათოლოგიის გარეშე. ორმხრივ ლავინზედა, ლავინქვედა და ილლიის ფოსოებში გადიდებული ლიმფური კვანძები არ ისახება. ლავინზედა მიდამოებში ისახება ერთეული 5-8მმ. ზომის ლიმფური კვანძი.

ტრაქეაში ისახება საინტუბაციო მილი, ზედა ღრუ ვენაში კათეტერი, საყლაპავში ნაზოგასტრალური ზონდი.

ფარისებრი ჯირკვალის ისახება სწორი, მკაფიო კონტურებით, სტრუქტურა არაჰომოგენური, გადიდებული არ არის.

შუასაყარი არ არის ცდომილი, შუასაყარში გადიდებული ლიმფური კვანძები არ ისახება. გული არ არის გადიდებული. მაგისტრალური სისხლძარღვები დილატაციის გარეშე. პერიკარდის სინუსებსა და ჯიბეებში ისახება მინიმალური რაოდენობით სითხე. ორმხრივ პლევრის ღრუებში სითხე არ აღინიშნება.

ტრაქეო-ბრონქული ხე გამავალია. ფილტვებში ორმხრივ ქვედა წილებში მეტად მარჯვნივ ისახება ხაზოვანი ატელექტაზური ცვლილებები. ქვედა წილებში ორმხრივ ვლინდება მსუბუქი ჰიპოპნევმატიზაციის და ნაზი ინფილტრაციის ტიპის კერები.

ვიზუალიზებულ ძვლებში დესტრუქციული ცვლილებები არ ისახება.

პაციენტის მიერ მიღებული დასხივების დოზა (E): მზგ.

ექიმის ხელმოწერა:

ი. გახოკიძე